

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ПРИМАФАГ НЕО
PRIMAPHAGE NEO**

Торговое название препарата: ПРИМАФАГ НЕО

Действующие вещество (МНН): лизифаг поливалентный

Лекарственная форма: спрей для местного и наружного применения

Состав:

1 мл препарата содержит:

активные вещества: стерильно очищенный фильтрат фаголизатов бактерий *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis* и различных серогрупп *Escherichia coli*. Титр не менее 10^6 КОЕ/мл (по методу Грациа) и *Staphylococcus haemolyticus* с активностью не менее 10^5 (по методу Аппельман).

вспомогательные вещества: консервант - 8-гидроксихинолин сульфат или 8-гидроксихинолин сульфат моногидрат в пересчете на 8-гидроксихинолин сульфат 0,00001 г/мл или 0,001% от объёма жидкого фага (содержание расчетное) и вода очищенная.

Описание: прозрачная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, допускается зеленоватый оттенок.

Фармакотерапевтическая группа: Другие лечебные средства.

Код АТХ: V03A

Фармакологические свойства

ПРИМАФАГ НЕО – лекарственный препарат, обладающий специфическим бактерицидным действием в отношении штаммов *Staphylococcus haemolyticus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis* и различных серогрупп *Escherichia coli* наиболее значимых в этиологии гнойных и воспалительных заболеваний. Фаговые частицы прикрепляются к мембране чувствительной бактерии, проникают внутрь клетки и размножаются за счет её ресурсов. Вследствие этого происходит гибель клетки и выход зрелых вирулентных фаговых частиц, способных к заражению других чувствительных бактериальных клеток. Бактериофаг ПРИМАФАГ НЕО не влияет на другие бактерии, в частности не нарушает естественную микрофлору.

Показания к применению

- ПРИМАФАГ НЕО спрей применяют с лечебной и профилактической целью, в виде орошения инфицированных *Staphylococcus haemolyticus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus faecalis* и *Escherichia coli*, кожных покровов и слизистых оболочек при ожогах, гнойно-воспалительных заболеваниях, инфицированных ранах, при ангине. При пользовании флакон держать вертикально крышкой вверх и направить распылитель в обрабатываемую поверхность.

Лечение:

- хирургические инфекции: гнойная рана, ожог, абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул, гидраденит, панариций, парапроктит, мастит.
- бактериальные инфекции верхних дыхательных путей: гнойно-воспалительные заболевания уха, горла, носа, пазух носа, ротовой полости, глотки, гортани, (отит, ангина, фарингит, ларингит, стоматит, синусит, пародонтит, гайморит).
- гнойно-воспалительные заболевания новорожденных детей (омфалит, пиодермия, конъюнктивит).

Профилактика:

- обработка свежих ран;
- гнойных осложнений при хирургических манипуляциях и операциях.

Способ применения и дозы

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя заболевания (определение чувствительности препарата ПРИМАФАГу штаммов, выделенных от больного). Применение препарата является наиболее эффективным на раннем этапе заболевания, а также при его введении в самый очаг инфекции. С учетом локализации очага инфекции, препарат ПРИМАФАГ спрей может применяться:

- *местно* – в виде орошений, промываний, аппликаций, тампонов, турунд. При оральном применении препаратом следует обработать за 30-60 мин до еды;
- детям в возрасте до 11 лет миндалины целесообразно обрабатывать с помощью спрея – 5 распылении, с интервалом 3 часа, 4-5 раз в день;
- для взрослых 6-7 распылении, 6-7 раз в день.

Для лечения гнойно-воспалительных заболеваний с локальными поражениями ПРИМАФАГ НЕО спрей назначают одновременно как местно, так для *перорально (per os)*. Доза препарата-количество распылений, определяются характером очага инфекции (размер пораженного участка). Длительность курса лечения препаратом от 7 до 15 дней (по клиническим показаниям).

Побочные действия

Препарат нетоксичен. Какие-либо побочные явления не выявлены. В крайне редких случаях, при приеме внутрь может вызывать легкую непродолжительную рефлекторную тошноту, которая не требует отмены препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Лекарственные взаимодействия

Препарат можно применять совместно с препаратами любой группы.

Особые указания

- Начинать лечение бактериофагом следует как можно раньше. Перед использованием препарат необходимо взболтать.

МУТНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!

- Если до применения бактериофага для обработки раны использовались химические антисептики, рану необходимо тщательно промыть стерильным 0,9% раствором натрия хлорида;
- поскольку в препарате содержится питательная среда, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, после применения спрея, распылитель следует обработать раствором спирта.
- флакон необходимо хранить в холодильнике. Препарат, при соблюдении условий хранения, вышеперечисленных правил и отсутствии помутнения может быть использован в течение всего срока годности.
- пациентам пожилого возраста коррекция суточной дозы не требуется.

Беременность и период лактации

Применение данного препарата в период беременности и лактации возможно при наличии инфекции вызванных штаммами чувствительных к препарату (по рекомендации врача).

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не описаны.

Передозировка

Данные о передозировке не описаны.

Форма выпуска

1 флакон по 20 мл препаратом, с крышкой распылителем (спрей), в картонной коробке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от солнечного света месте при температуре от +2°C до +10°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «AZIYA IMMUNOPREPARAT»,
100206, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, 17-й квартал,
махаллинский комитет Кадрдон, дом-4Д. Телефон +998 95 170-46-16. Е-почта:
info@mediphag.uz

Наименование и адрес организации, принимающий претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан.

ООО «AZIYA IMMUNOPREPARAT»,
100206, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район, 17-й квартал,
махаллинский комитет Кадрдон, дом-4Д. Телефон +998 95 170-46-16. Е-почта:
info@mediphag.uz